

## الگوریتم درمان تاکی کاردی بزرگسالان

۱

شرایط بالینی بیمار و علائم و نشانه ها را بررسی کنید.  
در صورتیکه ضربان قلب بیمار ۱۵۰ یا بیشتر باشد بیمار تاکی کاردیا دارد.

۲

- علل زمینه‌ای را شناسایی و درمان کنید.  
- راه هوایی را باز کنید و در صورت نیاز تنفس مصنوعی بدهید.  
- در صورت هیپوکسیک بودن اکسیژن بدهید.  
- بیمار را مانیتورینگ کرده و ریتم قلبی را بررسی کنید.  
- فشار خون و پالس اکسی متری را بررسی کنید.

۴

- شوک سینکرونیز استفاده کنید.  
- از آرامبخش استفاده کنید.  
- در صورت وجود کمپلکس باریک  
منظم از آدنوزین استفاده کنید.

بلی

۳

علل مقاوم بودن تاکی کاردی و کاهش برون ده قلبی را بررسی کنید:  
- آیا هیپوتانسیون وجود دارد؟ - آیا تغییر سطح هوشیاری وجود دارد؟  
- آیا علائم شوک وجود دارد؟ - آیا درد قفسه سینه وجود دارد؟  
- آیا علائم نارسایی حاد قلبی وجود دارد؟

خیر

۵

آیا QRS پهن شده (بیشتر و  
یا برابر ۱۲/۰ ثانیه) است؟

بلی

خیر

۷

- رگ بگیریید.  
- نوار قلب ۱۲ لیدی بگیریید.  
- از مانور واگ استفاده کنید.  
- در صورت وجود ریتم منظم از آدنوزین استفاده کنید.  
- از بتابلاکرها یا بلوک کننده کانال کلسیم استفاده کنید.  
- با پزشک متخصص و ماهر مشورت کنید.