


## تاکی کاردیا کودکان همراه با نبض و پرفیوزن ضعیف

تشخیص و درمان علل زمینه ای  
راه هوایی را برقرار کنید و در صورت نیاز تهویه شود.  
مانیتور شود ریتم قلبی تشخیص و میزان فشارخون و پالس اکسی متری تعیین گردد.  
راه وریدی و یا استخوانی برقرار شود.  
نوارقلب ۱۲ لیدی اگر در دسترس است . درمان به تاخیر نیفتد.



### اقدامات / جزئیات

سینکرونیز (کاردیوورژن) با 0.5-1j/kg شروع کنید و در صورتیکه موفق نبود تا 2j/kg افزایش داده شود .  
در صورت نیاز به بیمار آرامبخش بدهید (Sedate) اما کاردیوورژن را به تاخیر نیندازید.

### دوز آدنوزین IV/IO

اولین دوز 0.1mg/kg بصورت بلوس سریع ( حداکثر 6mg )  
دمین دوز 0.2mg/kg بصورت بلوس سریع ( حداکثر 12mg )

### دوز آمیودارون IV/IO

5mg/kg در عرض ۲۰-۶۰ دقیقه یا

### دوز پروکائین آمید IV/IO

15mg/kg در عرض ۳۰-۶۰ دقیقه بصورت متداول آمیودارون و پروکائین آمید را همراه با یکدیگر مصرف نکنید .