

دستور العمل کارگذاری سوند معده

دستور پزشک (کاردکس و پرونده) را بررسی کنید.

مددجو را شناسایی کنید، با وی ارتباط برقرار کنید، روش و هدف انجام کار را برای وی توضیح دهید.

وسایل را آماده کنید: سایز مناسب سوند معده (۱۶ و ۱۸ برای بزرگسالان) ژل لوبریکنت، لیوان آب، سرنگ تامی، کیسه ادراری، دستکش یکبار مصرف، کاغذ PH، چسب، گوشی پزشکی

دستها را بشویید و دستکش یکبار مصرف بپوشید.

مددجو را در حد امکان در وضعیت نشسته قرار دهید.

حوله را روی سینه مددجو قرار دهید.

اندازه سوند، طول لوله را از نوک بینی تا نرمه گوش و از نرمه گوش تا زائده زایفوئید مشخص کنید و علامت بزنید.

سر مددجو را در وضعیت های مختلف (نشسته یا خوابیده)، به قفسه سینه بچسبانید تا مسیر مری باز شود.

باز بودن سوراخ های بینی را به صورت مرحله ای با مسدود کردن سوراخ های

بینی و تنفس توسط مددجو چک کنید

سر لوله را به اندازه ۱۵ - ۱۰ سانتی متر به ژل لوبریکنت آغشته کنید.

لوله را به آهستگی و دقت وارد سوراخ بینی که از باز بودن آن مطمئن شده اید بکنید تا جایی که وارد حفره حلق شود.

سر مددجویان هوشیار را به طرف جلو بیاورید، وی را تشویق به نوشیدن آهسته مقداری آب بکنید،

لوله را تا محل علامت زده شده به جلو هدایت کنید و سپس چسب بزنید

با انجام یک روش مناسب از قرار گرفتن لوله در معده مطمئن شوید. (با کشیدن محتویات معده با سرنگ ۵۰ - ۲۰ سی سی و برگرداندن محتویات یا کاغذ PH یا تزریق هوا با سرنگ ۲۰ سی سی و

سمع ناحیه اپی گاستر و یا گذاشتن نوک لوله در لیوان آب)

خارج کردن هوا را در صورت استفاده (تعیین محل لوله) جهت جلوگیری از نفخ بیمار انجام دهید

پس از اطمینان از قرار گرفتن صحیح، لوله را به روش صحیح روی لباس مددجو فیکس کنید.

در صورت نیاز انتهای سوند را به سرنگ تامی یا کیسه ادراری و یا ساکشن وصل کنید. (در غیر اینصورت لوله را با کلمپ خودش مسدود کنید)

دستکش ها را به روش صحیح بیرون بیاورید.

مددجو را در وضعیت راحت قرار دهید..

لوازم را سر جای خود قرار دهید.


دست ها را بشویید.

نحوه سوندگذاری را ثبت کنید.

تصاویر نحوه ی NGT (سوند بینی - معدی) گذاری




اندازه طول لوله از نوک بینی تا نرمه گوش تا زانده زایفونید را مشخص کنید و علامت بزنید



آناتومی




وسایل را آماده کنید.




سر مددجو را در حالتی که راست نشسته ، به وضعیت غذا خوردن قرار دهید.




باز بودن سوراخ های بینی را بصورت مرحله ای با مسدود کردن سوراخ های بینی و تنفس توسط مددجو چک کنید



پولیپ های سینوس



سپس چسب بزنید و پس از اطمینان از قرار گرفتن صحیح ، لوله را به روش صحیح روی لباس مددجو فیکس کنید.



با کاغذ PH از قرار گرفتن لوله در معده مطمئن شوید .



سر مددجو را به طرف جلو بیاورید، و تشویق به نوشیدن آهسته مقداری آب بکنید. لوله را تا محل علامت زده شده به جلو هدایت کنید.

